

⑥病理・細胞検査フォトサーベイ実施の手引

I. 概要と試料の取り扱い

病理・細胞検査のフォトサーベイを実施します。設問はすべて評価問題です。
設問は全部で 6 問あります。設問ごとに各 2 枚のフォトがあります。

II. サーベイ実施方法及び注意事項

1. 参加項目設定とコード選択時の注意事項
参加項目設定で参加にチェックしてください。チェックがない項目は回答できません。
最後に必ず【未入力チェック】を実施してください。
2. サーベイ実施方法
 - 1) 各設問文をよく読み、回答欄の中の 6 項目（1， 2， 3， 4， 5， 6）からサーベイ写真に最も適当と思われるものを 1 つ選んで回答してください。
 - 2) 該当コードがない場合は：その他 [] を選択してください。尚，「6.その他」を選択した施設で、理由がある場合は、コメント欄にご記入下さい。
 - 3) 評価は「フォトサーベイ評価法に関する日臨技指針」に沿って行います。
 - 4) 配布される印刷物のサーベイ写真は、WEB 画面上のそれよりも解像度が低下します。
ネット環境が整っている施設の方は、なるべく WEB 画面上にてサーベイ写真を確認して頂くことを推奨致します。

III. フォトサーベイ設問

設問の写真について、Pap はパパニコロウ染色を示します。また、強拡大は対物レンズ 40～100 倍相当、中拡大は対物レンズ 20 倍相当、弱拡大は対物レンズ 4～10 倍相当の細胞像です。

設問 1

年齢・性別：50 代 女性	検体：膣 擦過
臨床情報：膣壁に黒色病変あり	写真：【左】Pap, 強拡大，【右】Pap, 強拡大
選択肢：	
1. 萎縮性膣炎	2. 扁平上皮癌
3. 腺癌	4. 悪性リンパ腫
5. 悪性黒色腫	6. その他 []

設問 2

年齢・性別：40 代 女性

検体：子宮頸部 擦過

臨床情報：ASC-US の follow up

写真：【左】Pap, 強拡大, 【右】Pap, 強拡大

選択肢：

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1. 修復細胞 | 2. HSIL（高度異形成） |
| 3. 扁平上皮癌 | 4. 頸部腺癌 |
| 5. すりガラス細胞癌 | 6. その他〔 〕 |

設問 3

年齢・性別：60 代 男性

検体：気管支 擦過

臨床情報：原発性肺癌の疑い

写真：【左】Pap, 強拡大, 【右】Pap, 強拡大

選択肢：

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1. 扁平上皮癌 | 2. 腺癌 |
| 3. 小細胞癌 | 4. 腺様嚢胞癌 |
| 5. 悪性黒色腫 | 6. その他〔 〕 |

設問 4

年齢・性別：60 代 女性

検体：腹水

臨床情報：腹水貯留、腹膜肥厚あり

写真：【左】Pap, 強拡大, 【右】Pap, 強拡大

選択肢：

- | | |
|------------|------------------------------|
| 1. 反応性中皮細胞 | 2. 悪性中皮腫 |
| 3. 腺癌（胃癌） | 4. 小細胞癌 |
| 5. 悪性リンパ腫 | 6. その他〔 〕 |

設問 5

年齢・性別: 60 代 男性

検体：耳下腺 穿刺

臨床情報：右耳下腺腫瘍あり

写真：【左】Pap, 強拡大, 【右】Pap, 強拡大

選択肢：

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1. 腺様嚢胞癌 | 2. 分泌癌 |
| 3. 腺房細胞癌 | 4. 粘表皮癌 |
| 5. 扁平上皮癌 | 6. その他〔 〕 |

設問 6

年齢・性別：70 代 女性

検体：乳腺 穿刺

臨床情報：腫瘍性病変あり

写真：【左】Pap, 強拡大, 【右】Pap, 強拡大

選択肢：

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. 浸潤性乳管癌（腺管形成型） | 2. 浸潤性乳管癌（充実型） |
| 3. 浸潤性小葉癌 | 4. 髄様癌 |
| 5. 悪性リンパ腫 | 6. その他 [] |

IV. 問い合わせ先

問い合わせは、施設名、担当者名を明記の上、E-Mail で下記の担当者までお願い致します。

【担当者：清岡 征司】

〒879-5593

大分県由布市挾間町医大ヶ丘 1 丁目 1 番地

大分大学医学部附属病院 病理診断科・病理部

E-Mail : kiyooka-12@oita-u.ac.jp