


子どもに異変!! アレルギー症状かもしれない!

発見者(リーダー代行)
○子供から目を離さない
○養護教諭・管理職または他教職員を呼ぶ
○エピペン、緊急薬を準備
○マニュアル・個別対応シートを準備



ひとつでも
変?と感じたら
迷うことなく

一つでもあれば
迷うことなく

5分以内に下記の
症状を確認

- 全身の症状**
- ◇ぐったり
 - ◇意識もうろう
 - ◇尿や便を漏らす
 - ◇脈を触れにくい
 - ◇脈が不規則
 - ◇唇や爪が青白い

- 呼吸器の症状**
- ◇喉や胸がしめつけられる
 - ◇声がかすれる
 - ◇犬が吠えるような咳
 - ◇息がしにくい
 - ◇持続する強い咳・咳込み
 - ◇ゼイゼイする呼吸


- 消化器の症状**
- ◇持続する強い(我慢できない)お腹の痛み
 - ◇繰り返し吐き続ける

**エピペン®あれば
即! 使用**
エピペン®ない!
又は
エピペン®使用後

症状無ければ

- その場で安静
- 動かさない
- ショック体位
- 嘔吐があれば横向き
- 助けを呼び、人を集める

可能ならば 保健室へ移動
→必ず同伴
歩かせない
車いす・担架で移動
保護者に連絡



119番
救急車要請